



Application des Infoceutiques CEMP (ICs) : Transfert direct au corps

La méthode principale d'application pour les Infoceutiques CEMP est de directement les appliquer sur le corps (Méthode 3). En utilisant la [Méthode 1](#) ou [Méthode 2](#), vous pouvez également imprégner les ICs CEMP dans l'eau ou autres produits. Pour la Méthode 3, vous aurez besoin d'un [IC Pad ou IC Hummer](#), ainsi qu'un ordinateur/smartphone.



Étapes de la Méthode 3 :

1. Connectez-vous et choisissez l'IC CEMP.
2. Connectez l'IC Pad ou l'IC Hummer à votre ordinateur ou smartphone.
3. Définissez le volume de votre ordinateur/smartphone au niveau maximum si vous utilisez l'IC Pad ou jusqu'à 80% si vous utilisez l'IC Hummer.
4. Placez l'IC Pad ou l'IC Hummer sur la zone ciblée de votre corps, au-dessus de vos vêtements. Si aucune zone n'est spécifiée dans la description de l'IC CEMP, placez l'appareil sur le sternum.
5. Démarrez le transfert.



6. Lorsque le transfert de l'IC est terminé, retirez l'appareil de votre corps et répétez la procédure lorsque c'est nécessaire.

F.A.Q. CONCERNANT LES ICs BASÉS CEMP ET LA MÉTHODE 3 :

Que signifie CEMP ? Comment utilisons-nous les CEMPs ?

CEMP signifie Pulsed ElectroMagnetic Field (Champ Électromagnétique pulsé en Français). Ces ICs sont générés en utilisant un algorithme (plutôt qu'à l'aide d'une substance). La méthode principale d'application pour les ICs CEMP est de l'appliquer sur le corps en utilisant l'IC Pad ou l'IC Hummer (Méthode 3). Cependant, les ICs CEMP peuvent également être imprégnés dans l'eau, les jus, les crèmes, les huiles, etc. (Méthodes 1 & 2).

Combien cela prend de transférer les ICs CEMP ?

Le temps de transfert varie selon l'IC CEMP. Notez que si vous utilisez le Circuit IC Pad pour transférer les ICs CEMP, vous aurez besoin de "Répéter" le transfert plusieurs fois afin que le temps total de transfert d'IC atteigne un minimum de 12 minutes. Par exemple : Si l'IC CEMP sélectionné a un temps de transfert de 2 minutes, vous aurez besoin de sélectionner l'icône "Répéter" 6 fois avant de commencer le transfert.

Puis-je utiliser la Méthode 3 pour appliquer les ICs Imprégner sur la zone ciblée ?

Oui, vous pouvez appliquer les ICs Imprégner directement sur le corps en utilisant la Méthode 3. Cependant, il est recommandé d'utiliser la Méthode 1 ou la Méthode 2 (plus efficaces) pour les ICs Imprégner car elle utilise l'eau pour délivrer les ICs au corps.

Lors du transfert des ICs CEMP, dois-je placer l'appareil de transfert directement sur la peau ?

Non, lors du transfert des ICs CEMP vous n'avez pas besoin de placer l'appareil de transfert directement sur votre peau - vous pouvez simplement placer l'IC Pad ou l'IC Hummer au-dessus de vos vêtements.

Puis-je utiliser le Circuit IC Pad pour transférer les ICs CEMP directement sur mon corps ?

Bien qu'il est recommandé d'utiliser le Glowing IC Pad ou l'IC Hummer pour transférer les ICs CEMP dans votre corps, le Circuit IC Pad peut être utilisé. Cependant, lorsque vous utilisez le Circuit IC Pad, vous aurez besoin de transférer l'IC à plusieurs reprises afin que le total du transfert d'IC atteigne un minimum de 12 minutes. Par exemple : Si l'IC CEMP est de 2 minutes, vous aurez besoin de le transférer 6 fois consécutives (ex.: temps de transfert total de 12 minutes).



Où puis-je placer l'IC Pad ou l'IC Hummer pour transférer les ICs CEMP en cas de douleur général ou si une zone n'est pas spécifiée dans la description ?

Vous pouvez placer l'IC Pad ou l'IC Hummer sur le sternum, qui est un long os plat situé au centre de votre poitrine. L'IC Pad ou l'IC Hummer doit être placé au-dessus de vos vêtements.