



Extrait de noix verte Todicamp 115 ml



ОДИКАМП® — extrait de noix à maturité laiteuse et cireuse, dans un mélange d'hydrocarbures aliphatiques et marginaux. Il s'agit d'une préparation exclusive, dont la grande efficacité a été prouvée par un demi-siècle d'utilisation réussie dans plus de 60 pays à travers le monde.

Attention aux contrefaçons ! Utilisez uniquement la préparation originale de la société moldave TODICAMP® SRL.

En 47 ans d'existence, la technologie de fabrication de cette préparation n'a jamais dépassé la gamme Todik, mais Internet regorge de « recettes de préparation » et de « versions améliorées de Todikamp ». Cet article est rédigé par des personnes souhaitant vendre leurs imitations sous la marque TODICAMP®.

Action pharmacologique :

TODIKAMP® possède une action stabilisatrice membranaire, anti-inflammatoire et antitumorale prononcée. Il élimine les œdèmes interstitiels et contribue à la résorption des infiltrats et hématomes post-traumatiques. Il réduit les réactions allergiques et favorise la désensibilisation générale de l'organisme. Il restaure la formule sanguine, active l'immunité cellulaire, augmente l'activité phagocytaire des macrophages et stimule la chimiotaxie ; bloque les radicaux libres et ralentit l'oxydation peroxydique des lipides ; possède une activité antibactérienne et antifongique, prévient la pénétration des agents vitaux à travers la membrane cellulaire ; renforce les processus métaboliques et normalise l'équilibre hormonal ; il restaure la fonction hépatique et exerce un léger effet biliaire.



Indications d'utilisation :

Le médicament est utilisé pour le traitement des patients souffrant de maladies infectieuses aiguës et chroniques, de tumeurs malignes et bénignes, de troubles métaboliques, de pathologies du système cardiovasculaire, de troubles immunologiques, pour la récupération du corps après une intoxication grave et des dommages causés par les radiations.

Mode d'application :

La préparation est destinée à l'application locale orale et externe.

INGRÉDIENTS : TODIKAMP® se prend en interne à raison d'une goutte pour 2 kg de poids corporel, 1 à 3 fois par jour, 30 minutes avant les repas. Il est recommandé de commencer par 7 gouttes, puis d'augmenter progressivement jusqu'à la dose recommandée. En cas de cancer sévère, la dose peut être multipliée par 3, en buvant obligatoirement 1 cuillère à soupe d'huile de lin. En cas d'intoxication (nausées, maux de tête, faiblesse, perte d'appétit), interrompre le traitement pendant 2 jours et réduire la dose à 5 gouttes. L'apparition de ces symptômes indique la guérison des foyers d'infection, la mort des cellules tumorales et la pénétration de leurs produits de décomposition dans la circulation sanguine. Il est également recommandé de boire beaucoup d'eau alcaline et de prendre des sorbants (sorbolite, argile blanche, etc.).

COMPRIME : Une compresse propre pliée en quatre épaisseurs, de la taille d'une paume, est imbibée de TUDIKAMP® (pas plus d'une cuillère à café) et appliquée sur la peau de l'organe affecté. Appliquez ensuite du papier compressé et un tissu épais sur la compresse. Après 20 minutes, la compresse est reposée et la peau est lubrifiée à l'huile d'olive. Ces compresses sont utilisées en cas de lésions profondes des articulations et des organes internes.

RASTIRANIE : Appliquer une petite quantité de TUDIKAMP® sur la peau et masser jusqu'à absorption complète. Ce produit est indiqué pour les lésions sous-cutanées, musculaires et articulaires.

LUBRIFICATION : Appliquer TUDIKAMP® sur la peau lésée sans frotter. Il est indiqué pour les lésions cutanées superficielles et le tissu adipeux sous-cutané.

SPRINGS AND : Mélanger 1 ml de TUDIKAMP® avec 1 ml d'huile d'argousier ou de lin et introduire dans le vagin à l'aide d'une seringue ou d'une seringue sans aiguille. Efficace pour le traitement des pathologies du col de l'utérus et des organes pelviens.

MICROCLIZER : 3-5 ml. TUDIKAMP® mélanger avec 5 ml. d'huile de lin et introduire dans le rectum.

RÉGIME PRIMENENIA PRI NAIBOLEE RASPROSTRANENNYH ZABOLEVANIAK

MALADIES GASTRO-INTESTINALES :

Gastrite, gastrite, entérocolite, pancréatite.

prendre à l'intérieur 3 fois par jour 30 minutes avant les repas à la dose calculée (RD) et compresser sur la zone de l'estomac 1 fois par jour.

Hémorroïdes, rectite, fissures de l'intestin droit.

réception interne en RD + microclyses 1 fois par jour + frottements de la région pubienne.

INVASIONS DE BIEN : réception interne 3 fois par jour, lubrification de la région ombilicale 2 fois par jour, compresse sur la zone du foie 1 fois par jour, microclyses 1 fois par jour.

MALADIES COURANTES :

Grippe, bronchite, SRAS, amygdalite, pneumonie.

Ingestion en RD 3 fois par jour, compresses sur les poumons ou la gorge 1 fois par jour, lubrification des amygdales 2 fois par jour.

Гаймориты, frontite.



Apport interne 3 fois par jour, lubrification des sinus et des sinus frontaux 2 fois par jour, gouttes dans le nez 3 fois par jour, diluées avec de l'huile de lin 1:2.

Otite.

Réception interne 3 fois par jour, lubrification de la zone de l'oreille 3 fois par jour.

MALADIES DES ARTICULATIONS ET DE LA COLONNE VERTÉBRALE :

Ecchymoses, hématomes, entorses, fractures, foulures, arthrite, arthrose, ostéochondrose.

Réception interne 3 fois par jour, compresse 1 fois par jour et frottement de la zone endommagée 2 fois par jour.

TUMEURS BÉNIGNES ET MALIGNES, MÉTASTASES DE TOUTE LOCALISATION :

Apports internes à dose augmentée (prescrite par un spécialiste), compresses externes une fois par jour et frictions sur les zones affectées deux fois par jour. En cas de douleur intense, frictions jusqu'à 5 fois par jour, en lubrifiant la peau après l'intervention avec de l'huile de lin.

MALADIES DE LA PEAU :

Lésions fongiques de la peau, des cheveux et des ongles, furoncles, phlegmons, acné, panaris, chute de cheveux, papillomes, verrues.

Lubrification de la lésion 3 à 4 fois par jour et réception interne 3 fois par jour.

MALADIES AUTO-IMMUNES :

lupus érythémateux disséminé, sclérodermie, polyarthrite rhumatoïde, sarcoïdose, sclérose en plaques.

Réception en dosage augmenté (prescrit par un spécialiste), compresses 1 fois par jour, frictions 3 fois par jour

MALADIES GYNÉCOLOGIQUES :

Endocervicite, érosion du col de l'utérus, polypes, fibromes et myomes, prolapsus de l'utérus, inflammation des trompes, des appendices et des ovaires, kystes ovariens, infertilité, mastopathie, mammite.

Réception interne 3 fois par jour, douches vaginales 1 fois par jour, microclyses 1 fois par jour, frottement de la zone sus-pubienne et inguinale 2 fois par jour.

MALADIES UROLOGIQUES :

Prostatite aiguë et chronique, pyélonéphrite, glomérulonéphrite, adénome de la prostate, trouble de la puissance.

Ingestion 3 fois par jour, microclyses 1 fois par jour, frottements de la zone inguinale et sus-pubienne 1 fois par jour, compresses sur la zone rénale 1 fois par jour, en alternant côté droit et côté gauche.

MALADIES NÉVROLOGIE :

Névrite, névralgie, radiculite, polyradiculonévrive, lumbago, états post-insultants, parésie et paralysie, migraines, violation de la circulation cérébrale.

Утренний прием 3 раз в день, компресс на обл. Une fois par jour, appliquez une compresse sur la zone douloureuse, puis frottez le long de la colonne vertébrale 2 à 3 fois par jour. En cas de troubles cérébraux, lubrifiez les régions frontale, pariétale et temporale de la tête 2 fois par jour et instillez des gouttes dans le nez 1 fois par jour.

MALADIES CARDIAQUES :

Thrombophlébite, varices, endartérite oblitérante, athérosclérose.

Внутренний прием 3 в в день, растирание раженной области 2 раз в день, компресс на обл. pecheni 1 fois par jour, compresser sur les varices 1 fois par jour.



POUR RENFORCER L'EFFET GÉNÉRAL, il est recommandé de frotter TODIKAMP® le long de la colonne vertébrale 1 à 2 fois par jour, et également de frotter les pieds avec, ce qui active grandement les fonctions de tous les organes internes, car ils ont des projections à la fois sur le pied et sur la colonne vertébrale.

Effets secondaires :

Le médicament est généralement bien toléré par les patients. Cependant, dans de rares cas, des troubles digestifs et des nausées peuvent survenir. Une irritation cutanée locale peut survenir.

Contre-indications :

Sensibilité et intolérance individuelles accrues aux préparations à base d'iode.

Grossesse :

L'efficacité et la sécurité d'emploi du médicament chez les femmes enceintes et allaitantes ne sont pas prouvées.

Précautions :

L'administration de doses excessives a entraîné l'apparition de nausées, de vomissements, d'indigestion et de céphalées. En cas de surdosage, un lavage gastrique est indiqué. Un traitement symptomatique est administré si nécessaire.

Formulaire de libération :

Bouteilles de 115 ml. en plastique médical foncé.

Conditions de conservation :

Il est recommandé de conserver la préparation dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et du feu, à une température comprise entre 15 et 25 °C.

Durée de conservation : 3 ans.

Attention !

Cette description est un mode d'emploi simplifié. Les informations concernant la préparation sont fournies à titre purement informatif et ne doivent pas servir de guide d'automédication. Seul un spécialiste peut décider de la prescription de la préparation, ainsi que des doses et des modalités d'administration. Les méthodes d'administration de TODICAMPA® ont été développées par les spécialistes de SOMA MEDICAL GROUP pour cette préparation fabriquée en Moldavie selon la recette originale d'Andrey Mihajlovic Todik par la société TODICAMP® SRL.

Attention

! Les informations de ces pages ne doivent pas être utilisées pour diagnostiquer ou traiter des problèmes de santé, ni pour remplacer des médicaments et traitements prescrits par un professionnel de santé agréé. Toutes les informations de ce site sont publiées à titre informatif et peuvent contenir des erreurs. Veuillez vous référer uniquement aux informations de la notice ! Il est possible que les informations de cette page contiennent des inexactitudes : la photo est fournie à titre informatif et peut être modifiée par le fabricant sans préavis ou contenir des erreurs.

L'

acheteur est tenu de vérifier les produits lors de leur retrait.



Conformément à la loi n° 105-XV du 13 mars 2003 relative à la protection des consommateurs
, les produits ne peuvent être retournés après l'achat.

<https://farmacie.md/ro/product/todicamp-extract-din-nuci-grecesti-verzi-115ml?srsltid=AfmBOoqewY4E4iEy73VCRMt2Rdr0qoRLNBQ-hBmlVY2vJAmEHmAsW52W>